

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Ancienne Conserverie de CASAMOZZA

LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 93
 du 17 Février 1987

- Votre abonnement 1986 cessera après l'envoi du prochain bulletin - vous trouverez ci-joint une feuille de réabonnement.
- Les traitements contre *la cloque du pêcher*
- Préparez vos serres pour les cultures de printemps.

PECHER

Cloque du pêcher

Rappelons que les attaques les plus graves résultent des premières contaminations. Elles durent jusqu'à l'étalement des premières feuilles. Le stade pointe verte du premier traitement est maintenant atteint sur les bourgeons à bois terminaux, dans tous les vergers. Ne tardez pas!

Effectuez un deuxième traitement deux à trois semaines après le premier. Un troisième traitement doit être réalisé si une pluie de 20 mm lessive le traitement précédent.



Pointe verte ou
rougeâtre au
centre des écailles

: Ces deux traitements sont impératifs. Une :
: fois la maladie déclarée, aucun rattrapage :
: n'est possible. :
:

P.S.

VIGNE

Ne tardez pas pour effectuer les traitements d'hiver.

CULTURES MARAICHERES

Pour diminuer les risques de multiplications de spores de champignons, de bactéries, et d'insectes, il est indispensable de :

--> arracher et détruire les restes de cultures au moins un mois avant l'installation de la nouvelle.

--> nettoyer et **desherber** les abords de serre, (les mauvaises herbes abritent les insectes et les maladies).

--> désinfecter les infrastructures des serres;
trois familles de produits existent:

- produits chlorés (ex = eau de javel à 0,3 %) très bonne efficacité mais produits corrosifs pour les métaux.

- formol à 3 %, très bonne efficacité mais laisse une odeur désagréable.

- ammonium quaternaires = HORTINÈT ou HORTISEPTYL
bonne efficacité sur bactéries, moyenne sur champignons.

--> utilisez des terreaux sains ou désinfectés avec un fumigant (dazomet, metam sodum, ou **bromure de methyle**) ou un fongicide liquide:

* oxyquinoleine (CRYPTONOL LIQUIDE)
produit polyvalent

* propamocarbe HCL (PREVICUR N) contre les *pythium* et *phytophthora*.

(C) SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1987 : Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.